




UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Produit répondant aux principes de la biodynamie.



AMM N°1080002

XEOX le seul stimulateur de croissance racinaire homologué, agit sur la protection des auxines et active le processus de lignification cellulaire, facteurs essentiels de la croissance racinaire.


L'OSYR, matière active du XEOX, obtenue par la dépolymérisation de composés ligno-cellulosiques, stimule la croissance et la régénération racinaire en protégeant les auxines des mécanismes oxydatifs et en stimulant la production d'isopéroxydases.




PRÉCONISATIONS

- + FLEURISSEMENT URBAIN :**
Garantit une bonne installation des annuelles et bisannuelles à la plantation. Permet une meilleure résistance aux stress en cours de saison.
- + PRODUCTION HORTICOLE ET PÉPINIÈRE**
Sécurise la reprise lors du repotage des boutures racinées, des micro-mottes, des plants issus de semis. Garantit une production homogène.
- + PLANTATION (ARBRE, ARBUSTE)**
Limite les stress à la plantation. Optimise la reprise des végétaux.
- + GAZON**
Assure l'enracinement du gazon en plaque. Limite la régression racinaire due aux stress (hydriques, thermiques...) sur gazon sportif. Sécurise l'installation des semis de regarnissage sur terrains de sport.

ORGANIC[®]
Nature
ESPACES VERTS




Comparatif sur surfinias après traitement XEOX




Gazons Ray-Grass après traitement XEOX




Variation du poids moyen de racines



Comparatif sur plantes annuelles et bisannuelles après traitement



Variation de la surface foliaire






AMM N°1080002

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Produit répondant aux principes de la biodynamie.



Comparatif sur coronilles 2 mois après repiquage



Comparatif sur cyprès de Leyland 2 mois après repiquage




Comparatif sur lauriers-Tin 2 mois après repiquage



Variation du volume racinaire 2 mois après repiquage



Variation du volume racinaire au stade commercial



TRAITEMENT

- Augmentation du volume et poids des racines
- Meilleure gestion des besoins hydriques et minéraux
- Résistance des plantes en situation de stress

COMPOSITION

XEOX renferme 40% de matière active (Osyr) et 50% de matière sèche.

CONSEILS D'UTILISATION

XEOX est apporté en dilution dans l'eau, dans un minimum de 300 l/ha en pulvérisation suivi d'un arrosage superficiel, ou en goutte-à-goutte et en arrosage à la concentration de 0,2%. Produit compatible physiquement avec la plupart des produits de traitement, consulter votre technicien pour plus de précisions.

APPLICATIONS

- Gazons** Après placage ou après levée :
2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle.
En entretien et périodes de stress (climatiques, piétinement, aération, salinité, phyto...) :
2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle.
Doses d'application : 1 à 2 l/1000 m²
- Fleurs** Après repiquage ou après levée :
2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle.
En entretien, relance en situation de stress :
2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle.
Doses d'application : en arrosage à 0,2 % ou en pulvérisation à 1-2 l/1000 m²
- Arbres arbustes fruitiers ornementaux** En pépinières : 2 à 4 applications à 8-10 jours d'intervalle au printemps et en début d'automne, avant commercialisation.
Après plantation et en entretien, en situation de stress :
2 à 4 applications à 8-10 jours d'intervalle.
Doses d'application : en arrosage à 0,2 % ou en plantation (2 l/1000 m²) et entretien (1 à 2 l/1000 m²).

CONDITIONNEMENT

Bidons de 10 litres.



ORGANIC[®]
Nature
ESPACES VERTS